



Здуття та кольки?

КОЛІКІД®

Кишкові кольки – раптові напади плачу чи занепокоєння немовлят протягом 3 і більше годин не менше 3 днів на тиждень тривалістю хоча б один тиждень (Римські критерії III).

ПАТОГЕНЕЗ ДИТЯЧИХ КИШКОВИХ КОЛЬОК

Функціональна незрілість ШКТ

- Низька активність лактази
- Незрілість моторики кишечника
- Незавершена бактеріальна колонізація кишечника

Функціональна незрілість ЦНС

Нестійкість циклу «сон – неспання»




Порушення взаємини «дитина – батьки»

Гастроінтестинальні прояви непереносимості білків коров'ячого молока

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Симетикон – це ефективний і безпечний піногасник. Механізм дії симетикону ґрунтується на ослабленні поверхневого натягу пухирців газу в травному тракті, що приводить до їх розриву і подальшого виведення газів з організму.



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ СУСПЕНЗІЇ КОЛІКІД® ПРИ КОЛЬКАХ

Новонароджені та діти раннього віку

Від 0,5 до 1 мл суспензії Колікід® додають до пляшечки з дитячим харчуванням або дають після годування за допомогою маленької ложечки 4–6 разів на день.

ПЕРЕВАГИ СУСПЕНЗІЇ КОЛІКІД®

- Не містить цукру, шкідливих домішок і добавок
- Не містить спирту
- Не містить лактози (безпека застосування у дітей з лактозною недостатністю)
- Не містить консерванти (лимонну, бензойну, сорбінову кислоти)
- Має тільки місцеву дію (не всмоктується у ШКТ)
- Має доступну ціну за упаковку
- Український виробник
- Містить у складі більш ефективну молекулу (симетикон)



НЕДОЛІКИ КОНКУРЕНТІВ

- Наявність у складі спирту
- Наявність у складі консервантів (лимонної, бензойної, сорбінової кислоти)
- Наявність у складі цукру
- Висока ціна за упаковку
- Імпортований з-за кордону