



## Вздутие и колики?

# КОЛИКИД

**Кишечные колики** – внезапные приступы плача или беспокойства младенцев на протяжении 3 и более часов не менее 3 дней в неделю продолжительностью хотя бы одну неделю (Римские критерии III).

### ПАТОГЕНЕЗ ДЕТСКИХ КИШЕЧНЫХ КОЛИК

#### Функциональная незрелость ЖКТ

- Низкая активность лактазы
- Незрелость моторики кишечника
- Незавершенная бактериальная колонизация кишечника

#### Функциональная незрелость ЦНС

Неустойчивость цикла «сон – бодрствование»




Нарушение взаимоотношения «ребенок – родители»

Гастроинтестинальные проявления непереносимости белков коровьего молока

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

**Симетикон** – это эффективный и безопасный пеногаситель. Механизм действия симетикона основан на ослаблении поверхностного натяжения пузырьков газа в пищеварительном тракте, что приводит к их разрыву и последующему выведению газов из организма.



### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ СУСПЕНЗИИ КОЛИКИД ПРИ КОЛИКАХ

#### Новорожденные и дети раннего возраста

От 0,5 до 1 мл суспензии Коликид добавляют в бутылочку с детским питанием или дают после кормления с помощью маленькой ложечки 4–6 раз в день.

### ПРЕИМУЩЕСТВА СУСПЕНЗИИ КОЛИКИД

- Не содержит сахара, вредных примесей и добавок
- Не содержит спирта
- Не содержит лактозы (безопасность применения у детей с лактозной недостаточностью)
- Не содержит консерванты (лимонную, бензойную, сорбиновую кислоты)
- Имеет только местное действие (не всасывается в ЖКТ)
- Имеет доступную цену за упаковку
- Украинский производитель
- Содержит в составе более эффективную молекулу (симетикон)



### НЕДОСТАТКИ КОНКУРЕНТОВ

- Наличие в составе спирта
- Наличие в составе консервантов (лимонной, бензойной, сорбиновой кислоты)
- Наличие в составе сахара
- Высокая цена за упаковку
- Импортируемый из-за рубежа